

牛磺酸颗粒致固定性药疹 1 例

赵益莉, 王玉凤, 田俊玲 (莱钢集团有限公司特钢医院, 莱芜 271105)

【中图分类号】R286; R944.1 【文献标识码】B 【文章编号】1007-4406(2005)02-0122-01

【病例】男, 8 mo。因患上呼吸道感染来我院儿科门诊就诊。患儿平素健康, 无药物过敏史。查体: t 37.5 °C, 咽部充血, 心肺(-)。予牛磺酸颗粒(济南永宁制药股份有限公司, 批号 02012063, 每包 0.4 g) 0.2 g, po, tid, 3 d 后患儿腮部出现形态不规则的红斑, 边缘略高起皮肤, 考虑为皮肤过敏。给予复方醋酸地塞米松乳膏(商品名: 皮炎平)搽患处,

1 d 后仍未消退, 且向周围蔓延。即停用牛磺酸颗粒, 给予肝素钠乳膏(商品名: 海普林软膏)搽患处, tid, 2 d 后药疹消退, 患儿腮部皮肤逐渐恢复正常。2 mo 后, 患儿再次患上呼吸道感染, 给予口服了相同厂家相同批号的牛磺酸颗粒, 患儿复现了上述同样的症状。至此证明了患儿固定性药疹系牛磺酸颗粒所致。

【作者简介】赵益莉(1973-), 女, 主管护师

(2004-10-25 收稿)

注射用白眉蛇毒血凝酶致支气管痉挛 1 例

潘桂华, 陈玉红 (山东省寿光市人民医院手术室, 寿光 262700)

【中图分类号】R286.3; R944.1 【文献标识码】B 【文章编号】1007-4406(2005)02-0122-01

【病例】女, 62 a。因卵巢肿瘤入院行肿瘤切除术。 t 37.5 °C, P 100 beats \cdot min⁻¹, BP 105/70 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa), 两肺听诊无异常。ECG 示频发房性早搏, 有 10 余年慢性支气管炎病史, 无其他药物过敏史。患者入手术室后, 采用全麻诱导插管后机控呼吸, 术中用维库溴铵、异氟烷维持麻醉。因手术创面渗血较多, 给予注射用白眉蛇毒血凝酶(商品名: 帮亭, 沈阳新马药业有限公司, 批号 20040101) 2 KU, iv, 给药后约 2 min, 患者突然出现憋气, 颜面潮红, 气道压由 18~19 kPa 升至 35~37 kPa, 潮气量降

至 150 mL, BP 90/60 mmHg, HR 132 beats \cdot min⁻¹, 两肺哮鸣音。立即手法控制呼吸, 同时给予地塞米松 10 mg, 异丙嗪 25 mg, 氨茶碱 0.25 g, 增加异氟烷吸入浓度, 静注氯胺酮 50 mg 缓解气道痉挛, 持续泵注多巴胺维持循环功能稳定。约 10 min 后, 患者面部潮红逐渐消失, 气道阻力降低, 气道峰压(气道峰压=气道阻力压+平台压)降为 22~24 kPa, 潮气量渐至正常, 双肺哮鸣音逐渐消失, BP 120/75 mmHg, HR 105 beats \cdot min⁻¹, 未再有支气管痉挛现象发生。

(2004-11-22 收稿)

【作者简介】潘桂华(1964-), 女, 主管护师。Tel: 0536-5298201; E-mail: zjbph@sina.com